


SIVIGILA

Sistema de
Vigilancia Epidemiológica

Es importante conocer cuales son las zonas de alto riesgo endémico en nuestro país, de tal manera que podemos tomar medidas preventivas antes de exponernos a peligros biológicos.



-  Zonas de alto riesgo por fiebre amarilla
-  Zonas con influencia de fiebre amarilla
-  Zonas con mayor casos de contagio por malaria
-  Zonas con influencia de fiebre amarilla y malaria

El Ministerio de Salud de Colombia recomienda a la ciudadanía estar vacunada contra la fiebre amarilla bajo una dosis y con refuerzos de cada 10 años dependiendo recomendaciones médicas. En los municipios señalados en la grafica, asimismo exigirá estar vacunados a los visitantes de parques naturales del país.

Síntomas de la fiebre amarilla



Dolor de cabeza
y muscular



Fiebre > 39°



Tono amarillo
en la piel




Vómitos y falta
de apetito

Dengue

“El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema. La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos”.

***OPS - Organización panamericana de la salud

La mayoría de casos se registran en los departamentos del Tolima, valle, Santander, norte de Santander, Cundinamarca, meta, cesar, huila, Antioquia y putumayo



***La sintomatología ocasionada por la malaria es similar a la fiebre amarilla exceptuando el tono amarillo.

